

FICHA TÉCNICA

RAXTER MIX[®]_{W.P.} es un insecticida producido con una cepa patógena natural y selectiva de **Metarhizium anisopliae**, **Beauveria bassiana**, **Bacillus thuringiensis**, **Bacillus popilliae**. Capaz de parasitar insectos del orden Homóptera, Hemíptera y Coleóptera principalmente.

Cuando las esporas de **RAXTER MIX**[®]_{W.P.} entran en contacto con el cuerpo del insecto germinan e invaden al huésped a través de la cutícula por medio de enzimas que la degradan. Una vez dentro, el hongo libera toxinas que destruyen la hemolinfa, causando trastornos fisiológicos y daños en el sistema nervioso, provocando la muerte del insecto entre 4 y 7 días después de la infección.

1. COMPOSICION GARANTIZADA.

Composición Garantizada	<i>Metarhizium anisopliae</i> : 2.0 x 10 ⁸ UFC/gramo <i>Beauveria bassiana</i> : 2.0 x 10 ⁸ UFC/gramo <i>Bacillus thuringiensis</i> : 2.0 x 10 ⁸ UFC/gramo <i>Bacillus popilliae</i> : 2.0 x 10 ⁸ UFC/gramo
Porcentaje de Pureza Microbiológica:	Mínimo: 95%.
Humedad:	Máximo: 7%
Formulación:	Polvo mojable

2. CULTIVOS Y DOSIS.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS
Arroz	Sogata: <i>Tagosodes</i> sp. Cucarrón negro: <i>Eutheola bidentata</i> . Tibraca del arroz: <i>Tibraca</i> sp.	1-2 g/ Litro
Caña y Pastos	Salivazo Mosca pinta: <i>Aeneolamia</i> sp., <i>Prosapia</i> sp. Cucarrón de Invierno: <i>Mahanarva</i> sp., <i>Posischnur agenor</i> .	1-2 g/ Litro
Frutales (Arándanos, fresa,)	Trips: <i>Frankliniella occidentalis</i> Chizas: <i>Ancognatha</i> sp. Trozadores: <i>Phyllophaga</i> sp.	1-2 g/ Litro
Ornamentales	Trips: <i>Frankliniella occidentalis</i> Chizas: <i>Ancognatha</i> sp. <i>Phyllophaga</i> sp.	20 g / cama y drench (Repetir a los 20 días)
Papa	Chizas	1-2 g/ Litro
Plátano, Banano y Hortalizas	Picudo: <i>Cosmopolites</i> sp. Picudo: <i>Metamasius</i> sp. Picudo: <i>Rhychosporus</i> sp.	1-2 g/ Litro de agua



FT 8027
Actualizada:
2022-06-23
Versión: 2

FICHA TÉCNICA

3. PRESENTACIÓN.

- Bolsa 200g
- Bolsa 500g
- Bolsa 1Kg
- Bolsa 20Kg

4. CONSERVACIÓN.

Para almacenamiento a 12 meses: Manténgase a temperatura ambiente no mayor a 25°C.

5. CATEGORIA TOXICOLOGICA.

- Sin concepto toxicológico.

6. COMPATIBILIDADES.

- Puede usarse en mezcla con Insecticidas, Herbicidas y Fertilizantes.
- No debe usarse en mezcla con Fungicidas.
- Puede usarse con Coadyuvantes que no tengan alcohol.

7. PRECAUCIONES.

- Insecticida de uso agrícola.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No congelar.
- Destruir el envase y sus componentes después de usado.

El periodo de reingreso: tiempo entre la aplicación y el reingreso al lote es de 1 hora.

El periodo de carencia: tiempo desde la aplicación hasta la cosecha es de 1 hora.

8. No-GMO1.

Los insumos e ingredientes utilizados en la fabricación de **RAXTER MIX wp**. No fueron producidos usando técnicas de ingeniería genética y no son derivados de organismos modificados genéticamente.

9. EMPRESA PRODUCTORA.

BIO-CROP S.A.S.

Registro ICA de Productores 20023

Directo Clientes: (+57) 311-7134696 / (+57) 310-2457694

Oficina PBX: (+57) 310-4015754 / (+57)-602-2864646 ext. 2

Carrera 24 N° 21 – 31 Palmira- Valle- Colombia.

Página web: www.bio-crop.com

