

FICHA TÉCNICA

RAXTER MIX[®]_{W.P.} es un insecticida producido con una cepa patógena natural y selectiva de **Metarhizium anisopliae**, **Beauveria bassiana**, **Bacillus thuringiensis**, **Bacillus popilliae**. Capaz de parasitar insectos del orden Homóptera, Hemíptera y Coleóptera principalmente.

Cuando las esporas de **RAXTER MIX[®]_{W.P.}** entran en contacto con el cuerpo del insecto germinan e invaden al huésped a través de la cutícula por medio de enzimas que la degradan. Una vez dentro, el hongo libera toxinas que destruyen la hemolinfa, causando trastornos fisiológicos y daños en el sistema nervioso, provocando la muerte del insecto entre 4 y 7 días después de la infección.

1. COMPOSICION GARANTIZADA.

Composición Garantizada	<i>Metarhizium anisopliae</i> : 2.0 x 10 ⁸ UFC/gramo <i>Beauveria bassiana</i> : 2.0 x 10 ⁸ UFC/gramo <i>Bacillus thuringiensis</i> : 2.0 x 10 ⁸ UFC/gramo <i>Bacillus popilliae</i> : 2.0 x 10 ⁸ UFC/gramo
Humedad:	Máximo: 7%
Formulación:	Polvo mojable

2. CULTIVOS Y DOSIS.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Arroz	<i>Tagosodes sp.</i> <i>Eutheola bidentata.</i> <i>Tibraca sp.</i> Chizas.	500 g - 1 Kg/ ha	Repetir a los 15 días.
Caña y Pastos	<i>Homoptera, Hemiptera</i> (<i>Salivazos, chinches</i>)	1 - 2 g / Litro de agua.	Repetir a los 15 días.
Ornamentales	Chizas	50 g / cama	Repetir a los 15 días (en drench).
aguacate	Chizas, Picudos, Cochinilla, <i>Trips, Áfidos.</i>	1 - 2 g/ Litro de agua.	Repetir a los 15 días (en drench).



RAXTER^{MIX_{WP}} Insecticida

FT 1024
Actualizada:
2024-05-01
Versión: 4

FICHA TÉCNICA

Café	<i>Chizas, picudos y escamas</i>	1 g/L	Repetir a los 15 días.
Frutales (Piña, Melón, Sandía, gulupa, piña, uchuva, fresa, lulo, maracuyá, entre otros.)	<i>Chizas, Picudos, Trozadores, Trips, Áfidos</i>	500 g- 1Kg/ ha	Repetir ate presencia de la plaga.
Cítricos	<i>Chizas, Picudos, Cochinilla, Trips, Áfidos.</i>	1-2,5 g/L	Repetir a los 15 días.
papa	<i>Chizas</i>	1 kg/ha	Al momento de la siembra o inyectado en el desyerbe
Hortalizas (Lechuga, repollo, tomate, repollo, Lechuga, Espinaca, brócoli y otros.)	<i>Chizas, Picudos, Trozadores, Trips, Áfidos</i>	500 g- 1Kg/ ha	Repetir ate presencia de la plaga.
Plátano Banano	Y <i>Picudo: Cosmopolites sp. Picudo: Metamasius sp. Picudo: Rhychosporus sp.</i>	1 - 2 g/ Litro de agua.	Repetir a los 15 días.

3. PRESENTACIÓN.

- Bolsa 200g
- Bolsa 500g
- Bolsa 1Kg
- Bolsa 20Kg

4. CONSERVACIÓN.

Para almacenamiento manténgase a temperatura ambiente bajo sombra, en lugares secos y aireados.

5. CATEGORIA TOXICOLOGICA.

- Sin concepto toxicológico.



RAXTER^{MIX_{WP}} Insecticida

FT 1024
Actualizada:
2024-05-01
Versión: 4

FICHA TÉCNICA

6. COMPATIBILIDADES.

- Puede usarse en mezcla con Insecticidas, Herbicidas y Fertilizantes.
- No debe usarse en mezcla con Fungicidas.
- Puede usarse con Coadyuvantes que no tengan alcohol.

7. PRECAUCIONES.

- Insecticida de uso agrícola.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No congelar.
- Destruir el envase y sus componentes después de usado.

El periodo de reingreso: tiempo entre la aplicación y el reingreso al lote es de 1 hora.

El periodo de carencia: tiempo desde la aplicación hasta la cosecha es de 1 hora.

8. No-GMO1.

Los microorganismos presentes en el producto **RAXTER MIX wp**, no están genéticamente modificados, no son patógenos y son 100% naturales.

9. EMPRESA PRODUCTORA.

BIO-CROP S.A.S.

Registro ICA de Productores 2604

Directo Clientes: (+57) 311-7134696 / (+57) 310-2457694

Oficina PBX: (+57) 310-4015754 / (+57)-602-2864646 ext. 2

Carrera 24 N° 21 – 31 Palmira- Valle- Colombia.

Página web: www.bio-crop.com

